

Till kännedomen om Coreida. — Hr D:r C. STÅL hade inlemnadt följande uppsats:

»Inom få familjer bland Hemiptera torde en sådan osäkerhet i slägtenas och gruppernas begränsning råda, som just i den ifrågavarande, och onekligen torde den i detta afseende jemte *Pentatomida* höra till de svårare. Orsaken till denna förbistring ligger hufvudsakligen deri, att man öfversett en mängd karakterer af den största vigt, såsom ocellernas ställning, bakom eller i samma linea med ögonens bakre kant, deras afstånd från hvarandra och från ögonen, formen af den bakom antennerna liggande delen af hufvudet, närvaron eller frånvaron af en bakom ögonen liggande liten valk, som hindrar eller tillåter hufvudet att dragas in i thorax ända till ögonen, närvaron af en nästan valkig ring i spetsen af thorax, denna sednares trubbiga eller förtunnade sidokanter, afståndet mellan de bakre benen, baklårens längd i förhållande till abdomen, baktibiernas längdjemförd med baklårens, formen af de så kallade »ostiola odorifera» och deras bihang, ställningen af stigmata, allt karakterer, hvarpå man hittills ej gjort afseende, under det att benens likformighet eller olikformighet jemte deras beväpning, hufvudets totalform (en i allmänhet falskt uppfattad karakter) jemte antennernas form och längd, så väl i sin helhet som deras särskilda leders hvar för sig, utgöra i deras olika och mångfaldiga, mestadels *endast specifika*, modifikationer de karakterer, på hvilka man hittills grundat släkten, och kombinerat dessa till större eller mindre, alltid misslyckade, grupper.

Jag hade ämnat att till denna uppsats, hvilken utarbetades under mitt vistande i Berlin, låta följa en schematisk öfversigt öfver alla mig bekanta släkten bland Coreida, men min hastigt påskyndade hemresa till fäderneslandet, der jag på långt när ej har tillgång till ett för ändamålet nödvändigt stort material, nekar detta. Jag hoppas dock att de många nya, enligt min åsigt välgrundade släkten, som här nedanför skola karakteriseras och de hittills obegagnade kännemärken, hvilka jag dervid framhåller,

skola åt studiet af denna familj lemna åtskilliga stödjepunkter och i någon mån underlätta detsamma.

Af några förut beskrifna släkten, hvaraf man hittills blott känt en eller ett ganska ringa antal arter, har jag beskrifvit nya sådana.

BARDISTUS. DALL.

Præter *Bardistum serrulatum* huc etiam pertinet:

1. *B. crenulatus*. — Sericeus, testaceo-flavescens, subtus cum pedibus dense fusco-conspersus, antennis nigricantibus; vittis 4 (mediis 2 valde approximatis) obsoletis thoracis fuscis, hujus angulis lateralibus acute prominulis, marginibus lateralibus crenatis; membrana parce fusco-conspersa. ♀. Long. 22, lat. 8 millim. — Brasilia. Mus. Berol.

Statura *B. serrulati* (= *umbrini*! BURM.), aliter coloratus, thorace utrimque dentatulo.

CNEMYRTUS. STÅL.

Corpus valde oblongum, parallelum. Caput quadratum, tuberculis antenniferis brevissimis, haud prominulis, lobo medio spatium inter illa occupante, paullo producto, obtuso. Rostrum fere ad coxas intermedias extensum. Antennæ corpore dimidio paullo longiores. Thorax postice ad angulos basales scutelli dentato-productus, collari nullo. Pedes mediocres, posteriores nonnihil distantes, postici a lateribus pectoris quam inter se duplo longius remoti; femoribus subtus spinula una alterave apicem versus armatis; tibiis triquetris sulcatis, omnibus æquicrassis; tarsis posticis articulo 1 apicalibus 2 paullo longiore. Abdomen hemelytris æquilatum.

Bardisto affine genus.

1. *C. scriptus* BURM. — *Cerbus scriptus* BURM. Handb. der Ent. II. p. 339. 1. — Brasilia.

MERARDUS STÅL.

Caput quadratum, tuberculis antenniferis haud prominulis, lobo medio obtuso, illis paullo longiore. Antennæ corpore fere $\frac{1}{3}$ breviores, æquicrassæ. Rostrum fere ad coxas medias extensum, articulo 1 caput vix superante, crassiusculo. Thorax postice bidentato-productus. Abdomen hemelytris nonnihil latius. Pedes mediocres, posteriores paullo (postici minus quam medii) distantes; femoribus anterioribus prope apicem subtus spinulis 2 armatis, posticis incrassatis; tibiis sulcatis, posticis femoribus paullo longioribus; tarsis posticis articulo 1 apicalibus 2 paullo longiore.

Cnemyrto affine genus.

1. *M. spinicrus*. — Dilute sordide olivaceo-flavescens, supra obscure punctatus, subtus pallidior; antennis pedibusque flavescence-testaceis. ♂. Long. 15, lat. 5 millim. — Brasilia. Mus. Berol.

Thorax angulis posticis acute prominentibus, marginibus lateralibus rectis, subtilissime crenulatis. Femora postica admodum incrassata, subtus granulata, medio spina sat valida armata. Tibiæ posticæ intus crenulatæ, prope basin spina majuscula instructæ.

MOLCHINA AM. et SERV.

1. *M. Linnéi*. — Obscurius ferruginea, supra parce obsolete, subtus (exceptis lateribus) densius sordide albido-sericea; antennis, pedibus, capite, rostro, limboque abdominis nigricantibus, hoc sordide luteo-maculato, antennarum articulis 2, 3 et 4 basin versus flavescens, 3 apicem versus leviter compresso-ampliato; thorace remote punctato (punctis nonnullis smaragdinis), hujus maculis nonnullis minutis maculaque corii parva media lævibus, obscurioribus; membrana obscure cupreo-ænea. ♀. Long. 25, lat. 8 millim. — Brasilia. Mus. Berol.

M. compressicorni brevior, antennis brevioribus. Antennæ articulo apicali basali paullo longiore, 3 secundo vix brevior. Thorax angulis posticis acute prominentibus, marginibus lateralibus rectis, parce minute crenulatis.

NOTOBITUS STÅL.

Corpus valde oblongum, nonnihil depressum. Caput quadratum, tuberculis antenniferis brevissimis, subprominulis, lobis medio et lateralibus ex parte inter et ante illa paullo productis. Antennæ longæ, graciles. Rostrum pedes intermedios æquans, articulo 1 capite multo longiore. Ocelli inter se quam ab oculis vix latius distantes. Thorax postice truncatus. Femora omnia subtus spinulosa. Tibiæ posticæ femoribus æquilongæ, intus spinulosæ, triquetræ.

Huc pertinent species *Nematopi* generis asiaticæ, inter quas *N. meleagris* et *malay* mihi tantum cognitæ sunt.

CLORESMUS STÅL.

Corpus depressum, oblongum. Caput vix ad oculos immersum, tuberculis antenniferis haud prominulis, spatio inter illa (tuberculis latiore) a lobis occupato, his antrorsum productis, æquilongis, lateralibus angustioribus, apice acutis et subliferis; genis leviter dilatatis et prominulis. Ocelli inter se quam ab oculis paullo magis distantes. Antennæ corpore dimidio paullo longiores, articulo basali reliquis brevior et paullo crassior. Rostrum fere medium metasterni attingens, articulis 1 brevi, 2 et 3 æquilongis, illo longioribus, apicali præcedente longiore. Thorax collari instructus. Hemelytra abdomini æquilata; membrana parcius venosa. Pedes posteriores valde distantes, postici inter se quam a lateribus pectoris paullo magis remoti; femoribus subtus biserialiter spinulosis, posticis abdomine multo brevioribus, incrassatis; tibiis prismaticis, posticis femoribus vix æquilongis; tarsi posticis articulo 1 apicalibus 2 brevior, apicali vix longiore.

Notobito affine genus.

1. *C. Signoreti*. — Sordide testaceo-flavescens, supra distincte punctatus, capitis macula intraoculari femoribusque posticis apicem versus fuscis; hemelytris aëneo-indutis. ♀. Long. 12, lat. 3½ millim. — Java. Mus. Berol.

Antennæ articulo 3 secundo nonnihil brevior, 4 eodem paulo longiore. Thorax angulis posticis haud prominulis, obtusis, antè impunctatus, minutissime subgranulatus, posterius ruga transversa levi. Meso- et metastethia granulata, posterius cum prostethio distincte punctata.

DIARIPTUS STÅL.

Corpus elongatum. Caput quadratum, cum oculis thoraci antico æquilatum, usque ad oculos thoraci immersum, lobo medio spatium totum inter tubercula antecunifera occupante, obtuse paulo prominulo. Antennæ corpore fere $\frac{1}{3}$ breviores, articulo 1 reliquis nonnihil crassiore, capite ter longiore, apicali illi æquilongo, 2 mediis brevioribus, 2 tertio nonnihil longiore. Rostrum coxas anticas haud superans, articulo 1 brevi, capite fere $\frac{1}{2}$ brevior, reliquis crassiore, 2 et 3 æquilongis, illo nonnihil brevioribus, 2 tertio crassiore. Thorax collari instructus, postice utrimque oblique truncatus. Scutellum latitudinè basali nonnihil longius. Hemelytra abdomine paulo angustiora, et ei æquilonga; membrana venis simplicibus. Pectus haud sulcatum, mesosterno antice pone coxas anticas tuberculato-elevato. Abdomen segmentis 3 et 4 apice spina majore, 5 spina brevior armatis. Pedes mediocres, postici late distantes; femoribus anterioribus modice incrassatis, mediis subtus spinulis pluribus, anticis subtus prope apicem spinulis paucis armatis, posticis magis incrassatis, spinosis; tibiis posticis compressis, femoribus nonnihil longioribus; tarsis articulo 1 apicalibus 2 ad unum vix longiore, 2 tertio brevior.

Archimero affine genus.

1. *D. hexacanthus*. — Testaceo-flavescens; spinis abdominis nigris; capite ventrequè fere omnino lævibus, pectore thoraceque rude subrugoso-punctatis, hujus angulis lateralibus rectis, leviter prominulis; clavo distincte, corio obsolete punctatis. ♂. Long. 24, lat. 5½ millim. — Cametà. Mus. Berol.

♂. Femoribus posticis valde incrassatis, seriebus pluribus spinularum armatis; tibiis posticis leviter extrorsum arcuatis, intus medio levissime subdilatis, mox infra medium spina nigra, infra spinam illam spinulis pluribus armatis.

UGNIUS STÅL.

Corpus nonnihil depressum. Caput quadratum, vix ad oculos immersum, tuberculis antenniferis apice oblique truncatis, lobo medio spatium inter illa replente, antorsum acute producto. Antennæ corpore breviores, subgraciles, articulo basali leviter incrassato, secundo brevior. Rostrum fere trans coxas intermedias extensum, sat gracile, articulo 1 parum incrassato, caput nonnihil superante, 2 illi vix æqui-

longo, 3 secundo longiore. Thorax collari distincto, angulis anticis acute productis, basi supra scutellum truncatus, marginibus attenuatis. Membrana simpliciter venosa. Pedes mediocres, posteriores, præsertim postici, distantes, femoribus subtus spinosis, posticis incrassatis; tibiis triquetris, posticis reliquis uonnihil crassioribus, leviter compressis, femoribus vix æquilongis, apicem versus intus spinulosis; tarsis articulo 1 apicalibus 2 paullo longiore.

1. *U. kermesinus* LINNÉ. — Rufo-testaceus, thorace granulato; antennis nigris, articulo 3 basi pallido; hemelytris pectoreque valde distincte punctatis, illis fascia media flavo-albida, utrimque serie macularum nigrarum terminata, ornatis; membrana fusca. ♂. Long. 17, lat. $5\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia. Mus. Berol. et Holmiensi (e Museo DE GEERI).

Cimex kermesinus. LINNÉ. Syst. Nat. Ed. X. p. 450. 80; Ed. XII. 2. p. 732. 116.

Cimex rubro-balteatus. DE GEER. Mém. III. p. 339. 11. Tab. 34. 15.

Lygæus kermesinus. FABR. Ent. Syst. IV. p. 140. 20; Syst. Rhyng. p. 211. 30.

Species pulcherrima, rarissima, auctoribus recentioribus ignota. Huic generi verosimiliter adjungendus est: *Metapodus badius*. H. SCH. Wanz. Ins. IX. p. 258. (*Diactor badius*) fig. 997.

LYBINDUS STÅL.

Corpus oblongum, depressum. Caput vix ad oculos immersum, parte pone antennis subtransversa, tuberculis antenniferis vix prominulis, apice oblique truncatis, lobis medio et lateralibus ex parte inter illa deflexo-productis, illo his paullo longiore. Antennæ crassiusculæ, corpore multo breviores. Rostrum articulo 1 caput paullo superante, 2 illi vix æquilongo, 3 brevi. Ocelli inter se quam ab oculis magis distantes. Thorax collari instructus, angulis anticis acute prominentibus, marginibus lateralibus attenuatis, acutis, leviter reflexis. Hemelytra abdomine paullo angustiora, membrana simpliciter venosa. Abdominis segmentum 1 utrimque occultum. Pedes mediocres, postici valde distantes; femoribus posticis incrassatis; tibiis triquetris, posticis crassioribus, leviter compressis, femoribus æquilongis; tarsis breviusculis, posticis articulo 1 apicali vix longiore.

Ugnio affine genus.

1. *L. rufo-cinctus*. — Niger, supra cum pectore distincte punctatus, capite, marginibus lateralibus latiusculis thoracis, et costali corii angusto ultra medium nec non adomine rufo-testaceis. ♂. Long. 13, lat. 4 millim. — Rio Janeiro. Mus. Berol.

Capitis lobi parum producti. Antennarum articulus apicalis omnium longissimus. Rostrum fere ad coxas medias extensum. Thorax marginibus lateralibus levissime rotundatis, angulis posticis obtusis, hand prominulis. Femora postica valde incrassata,



recta, granulata, subtus spinulis nonnullis parvis instructa, antica prope apicem subtus spinulis parvis nonnullis armata. Tibiæ posticæ intus crenulatæ.

2. *L. dichrous*. — Supra nigricans, cum pectore distincte punctatus, subtus cum antennis, capite, collari marginibusque lateralibus thoracis limboque corii costali ultra medium, rostro pedibusque flavo-testaceus; pectoris vitta utrimque nigricante. ♀. Long. $12\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{2}{3}$ millim. — Brasilia. Mus. Berol.

Capitis lobi quam in *L. rufo-cincto* magis producti. Antennæ articulo apicali præcedente subbreuiore. Rostrum ultra basin ventris extensum. Thorax marginibus lateralibus rectis. Femora antica subinermia, postica paullo incrassata, subtus apicem versus spinulis nonnullis armata. Tibiæ posticæ inermes.

DIRNALUS STÅL.

Corpus subelongatum vel valde oblongum, depressum. Caput vix ad oculos immersum, tuberculis antenniferis haud prominulis, lobis spatium inter illa occupantibus, triangulariter productis. Antennæ corpore dimidio vix longiores. Rostrum coxas medias attingens, articulis 1—3 subæquilongis, 4 paullo longiore, 1 caput subsuperante. Ocelli inter se quam ab oculis duplo longius remoti. Thorax collari distincto instructus, angulis anticis acute prominentibus. Hemelytra abdomini æquilata; membrana venis parum furcatis. Mesosternum leviter sulcatum. Pedes breuiusculi, posteriores modice distantes; femoribus apicem versus serie spinularum rararum armatis, posticis abdomine multo brevioribus; tibiis posticis femoribus subæquilongis.

Præcedentibus affine genus.

1. *D. prominulus*. — Dilute ferrugineus, supra nigro-punctatus et cum pedibus obscurior; antennis membranaque nigris. ♀. Long. 17, lat. 5 millim. — Surinam. Mus. Berol.

Lobus medius capitis prope basin denticulo armatus. Thorax angulis lateralibus haud prominulis, obtusis, marginibus lateralibus rectis, anterie minute crenulatis. Antennæ articulis 1 et 4 (reliquis paullo crassioribus) nec non 2 subæquilongis, 3 illis paullo brevioribus, prope basin annulo pallido ornato. Femora postica anterioribus paullo crassiora.

NIROVECUS STÅL.

Corpus oblongum, subdepressum. Caput vix ad oculos immersum, tuberculis antenniferis haud prominulis, lobis spatium inter illa occupantibus, antrorsum parum productis. Ocelli inter se quam ab oculis duplo longius remoti. Antennæ corpore dimidio vix longiores, articulo apicali fusiformi, incrassato, basali capite brevioribus. Rostrum coxas medias haud superans, articulis 1 et 2 longiusculis, æquilongis, 3 brevioribus. Thorax collari minus distincto instructus, angulis anticis acutiuscule prominulis. Pedes breuiusculi, posteriores parum distantes; femoribus subtus spinulosis, posticis abdomine multo brevioribus, tibiis

posticis anterioribus vix crassioribus, femoribus æquilongis; tarsi postici articulo 1 apicalibus 2 subæquilongo.

Præcedentibus affine genus.

1. *N. claviger*. — Sordide flavo-albidus, parce dilute ferrugineo-adspersus, supra sat dense ferrugineo-punctatus; membrana sordida, fusco-venosa; antennis sordide subferrugineis; thorace utrimque hemelytrisque basi anguste pallido-limbatis, illo antice intra limbum utrimque nigricante; ventris disco utrimque serie macularum parvarum nigrarum. ♀. Long. 8, lat. 2½ millim. — Mexico. Mus. Berol.

PLUMENTIS STÅL.

Corpus oblongo-subovatum. Caput cum oculis thoraci antico æquilatum, vix ad oculos immersum, tuberculis antenniferis lateralibus, lobis inter illa antrorsum prominentibus, parte pone antennis latitudine nonnihil longiore. Antennæ corpore dimidio nonnihil longiores, articulis basali et apicali incrassatis, illo capite dimidio vix longiore, hoc capiti vix æquilongo, 2 et 3 gracilioribus, secundo capite nonnihil longiore, 3 illo nonnihil brevior, apicali longiore. Rostrum medium segmenti ventralis secundi attingens, articulo basali capiti subæquilongo. Thorax latitudine brevior, angulis anticis acute prominulis, marginibus lateralibus acutis, attenuatis. Membrana venis fuscatis et parce anastomosantibus. Pedes mediocres, postici inter se quam a lateribus pectoris $\frac{1}{3}$ minus longe remoti; femoribus subincrassatis, posticis subtus prope apicem spinula armatis.

In vicinitate præcedentium locandum genus.

1. *P. porosus*. — Testaceus, thorace, hemelytris pectoreque fortiter, ventre subtilius punctatis; antennarum articulo apicali membranaque fuscis. ♀. Long. 13, lat. 4 millim. — Rio Janeiro. Mus. Berol.

CRINOCERUS BURM.

1. *C. hæmaticus*. — Obscure rufo-testaceus, punctatus, antennarum articulis 2 et 3 nigro-fuscis; membrana olivaceo-fusca. ♂. Long. 16, lat. 5 millim. — Brasilia (?). Mus. Berol.

Antennæ articulo 1 capite vix duplo longiore et articulo tertio paullo brevior, 2 basali paullo brevior et apicali paullo longiore. Thorax latitudine fere $\frac{1}{3}$ brevior, marginibus lateralibus quam levissime sinuatis, angulis lateralibus obtusis, prominentibus. Femora granulata, postica basi leviter curvata, valde incrassata, subtus biseriatis spinoso-tuberculata, tuberculis nonnullis serici interioris magnis. Tibiæ posticæ levissime extrorsum subcurvæ, intus minute tuberculatae, tuberculis nonnullis majoribus intermixtis. Thorax disco interdum obsolete subcarinatus.

2. *C. subcarinatus*. — Griseo-flavescens, supra distincte punctatus; antennis sordide testaceis; membrana vittaque utrimque obsolete pectoris fusciscentibus; thorace disco carina obtusa, inter-

dum obsoleta, longitudinali instructo, marginibus lateralibus vix vel quam levissime sinuatis, angulis posticis obtusis, vix proniulis; antennis articulis 1 capite nonnihil longiore, 2 et 3 subæquilongis, illo longioribus, apicali basali paullo brevior. ♂ ♀. Long. 15, lat. 4 millim. — Monte Video. Mus. Berol.

Femora anteriora apice subtus fusco-hispinulosa, postica segmentum ventrale quintum paullo superantia, extus serie macularum parvarum fuscarum ornata, apud ♂ modice et quam apud ♀ magis incrassata, subtus spinis compluribus minoribus armata.

3. *C. rubro-ornatus*. — Niger, punctatus, capite subtus eum lobis, rostro, marginibus antico et lateralibus fasciaque abbreviata pone medium thoracis, margine scutellari commisuraque clavi, costa margineque apicali corii, abdomine supra (exceptis macula magna discoidali segmentorum maculisque minoribus marginalibus nigris), maculis magnis marginalibus, 2 obsoletis segmenti secundi, fasciolisque 2 subarcuatis segmenti tertii ventris, femoribus anticis subtus, tibiis anterioribus tarsisque rufo-testaceis. ♂. Long. 15, lat. 5 millim. — Brasilia. Mus. Holm.

Crinocerus rubro-ornatus. STÅL. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 184. 1. (♂).

Tubercula antennifera nonnihil distantia. Antennarum articuli 2 et 3 æquilongi, 1 illis paullo brevior, sed apicali paullo longior. Thorax longitudine plus $\frac{1}{2}$ latior, marginibus lateralibus rectis, subtiliter remote crenulatis. Femora postica abdomine nonnihil breviora, admodum incrassata, basi leviter curvata, supra tuberculis nonnullis minutis obsoletis, seriebus 2 dispositis, instructa, subtus seriebus 2 spinarum basin versus obsoletarum, tuberculiiformium, armata. Tibiæ posticæ compresso-triquetræ, intus spinuloso-tuberculatæ, femoribus paullo longiores.

PETALOPS AM. et SERV.

1. *P. cardinalis*. — Supra niger, hic illic æneo-punctatus, subtus eum parte antica et laterali thoracis, fascia media hemelytrorum, coxis, basi femorum anteriorum femoribusque posticis flavescens, capite supra, pedibus anticis, tibiis tarsisque posticis maculisque 2 lateralibus pectoris antennisque nigro-cyanicis. ♂. Long. 18, lat. 6 millim. — Parà. Mus. Berol.

Femora postica admodum incrassata, vix curvata, leviter compressa, subtus spinis, basin versus magnitudine decrescentibus, armata. Tibiæ posticæ triquetræ, intus multispinulosæ.

Statura *P. Megæwæ*. Rostrum articulo 3 secundo fere æquilongo.

2. *P. guttifer*. — Obscure æneus, remote aureo-sericeus, pedibus obscure castaneo-pellucidis, tibiis antennisque dilute castaneis, articulis horum apicem versus articulisque 2 apicalibus tarsorum nigris; maculis 2 anterioribus thoracis, maculis utrimque 5 pectoris venisque hemelytrorum sordide testaceo-flavescentibus; mem-

brana fusco-olivacea. ♂. Long. 21, lat. 5 millim. — Rio Janeiro. Mus. Berol.

Statura fere *P. azurei*. Antennarum articulus 3 secundo, 2 basali breviores (apicalis mutilatus). Thorax anterior valde declivus, utrimque leviter sinuatus, angulis lateralibus acute dilatato-prominentibus, serrulatis. Femora subtus multispinosa, spinis apicem versus magnitudine crescentibus; postica incrassata, supra biserialim tuberculata, intus apicem versus tuberculis 2 majoribus acutis armata. Tibiæ posticæ intus ante medium levissime dilatatae, denticulatae.

Huc etiam pertinent *Paryphes fenestratus* et *humeralis* BURM.

PLAXISCELIS SPIN.

1. *P. rustica*. — Griseo-flavescens, fusco-punctata, supra obscurior; antennis, vittis 2 capituli maculisque nonnullis minutis anticis thoracis nigris, articulo 1 antennarum intus linea pallida ornato; linea media lævi marginibusque lateralibus thoracis, apice imo scutelli costaque pallidis; pedibus dilute lutescentibus, femoribus nigro-irroratis, tibiis posticis tarsisque (excepto articulo 1 pallido anteriorum) fuscis. ♂ ♀. Long. 15—18, lat. 4½—5 millim. — Rio Janeiro. Mus. Berol.

Tibiæ posticæ parum dilatatae, parallelæ.

2. *P. plebeja*. — Pallide griseo-flavescens, supra obscurior et fusco-punctata; antennis, vittis 2 capituli maculisque valde minutis anticis thoracis nigris; linea interiore articuli 1 antennarum, linea lævi media marginibusque lateralibus thoracis, apice imo scutelli, costa ultra medium pallidis; femoribus apicem versus levissime infuscatis; membrana, tibiis posticis tarsisque fuscis; pectore vitta laterali dilute sanguinea, maculisque nonnullis parvis nigris ornato; ventre intra stigmata serie macularum parvarum nigrarum. ♂ ♀. Long. 12—16, lat. 4—5 millim. — Brasil. Mus. Berol.

Præter colores haud differt a congenericis.

MELYNTHUS STÅL.

Corpus leviter elongatum. Caput cum oculis sat prominentibus thorace anteo nonnihil latius, ad oculos immersum, tuberculis antenniferis breviter prominulis, lobo medio inter illa prominulo, licet spatium totum haud occupante, mox deflexo, eisdem haud longiore, obtuso. Antennæ valde graciles, articulo apicali reliquis longiore. Rostrum inter coxas medias extensum, articulo 1 caput paullo superante, 2 et 4 illi æquilongis, 3 breviora. Thorax collari et antice ruga transversa instructus. Scutellum latitudine paullo longius. Hemelytra abdomine nonnihil angustiora, parum longiora. Pedes longiuseculi; femoribus apicem versus levissime incrassatis, subtus apice spinulis nonnullis parvis instructis; tibiis posticis femoribus longioribus, utrimque leviter dilatatis; tarsis articulo 1 apicalibus 2 nonnihil longiore.

Plaxisceli affine genus.

1. *M. histrionicus*. — Griseo-albidus, antennis, capitis basi, lobo medio vittaque infera, thoracis marginibus lateralibus antice, litura discoidali ut littera T formata, limbisque latis postico-lateralibus, scutelli macula basali, hemelytris (exceptis maculis 3 corii, 1 basali, 1 subapicali, 1 transversa ad apicem clavi, griseo-albidis), maculis abdominis marginalibus supra subtusque, seriebus 4 macularum ventris, fasciolisque abbreviatis 6 lateralibus pectoris nigris; pedibus flavo-testaceis, geniculis, fasciaque ante medium tibiaram posticarum nigris. ♀. Long. 15, lat. 4 millim. — Brasilia. Mus. Berol.

Femora postica anterioribus haud crassiora; tibiæ posticæ intus parum, extus magis dilatata, parte dilatata exteriori ante medium latiore, medio leviter sinuata.

ANISOSCELIS LATR.

1. *A. sexmaculata*. — Supra eum antennis, rostro pedibusque nigricans, subtus fusco-ferruginea, maculis 6 pectoris, marginalibus abdominis supra subtusque, 4 thoracis (2 ante medium, 2 basilibus), discoidali corii nec non minima partis dilatatae interioris tibiaram posticarum lutescentibus. ♂. Long. 17, lat. 4 millim. — Pernambuco. Mus. Berol.

Thorax angulis posticis rectis, nonnihil prominulis. Femora anteriora prope apicem subtus spinulis 2, postica leviter incrassata, spinulis pluribus armata. Tibiæ posticæ fere a basi ad medium sensim dilatatae, parte dilatata interiori subbreuiore, angustiore, integra, exteriori apicem versus leviter dentata.

LEPTOSCELIS LAP.

1. *L. divisa*. — Nigra, venis corii discoidalibus rufis, fasciam angustam ramulosam formantibus; abdomine flavo-testaceo. ♂. Long. 17, lat. $4\frac{2}{3}$ millim. — Brasilia. Mus. Berol.

Statura omnino *L. hæmorrhoidalis*, coloribus distincta.

ALYDUS FABR.

Ad hoc genus hucusque relatæ sunt species numerosæ, quas me iudice melius per genera plura distribuuntur, secundum hoc schema:

1. (4.) Tibiis posticis rectis, cylindricis, apice intus haud dentato-productis.
2. (3.) Tibiis posticis femoribus longioribus *Alydus*.
3. (2.) Tibiis posticis femoribus brevioribus *Burtinus*.
4. (1.) Tibiis posticis plus minus curvatis, apice intus spinoso-productis.
5. (12.) Thorace posticæ mox extra angulos basales scutelli dentato-producto.

6. (7.) Hemelytris vitreis, membranaceis *Hyalymenus*.
7. (6.) Hemelytris coriaceis.
8. (11.) Rostrum ad coxas posticas extensum, vel parum brevius.
9. (10.) Thorace collari distincto. *Tivarbus*.
10. (9.) Thorace collari nullo *Tupalus*.
11. (8.) Rostrum ad coxas medias extensum. *Mirperus*.
12. (5) Thorace postice haud dentato-producto.
13. (16.) Capite inter oculos et antennis parallelo.
14. (15.) Rostrum trans coxas medias extensum. *Riptortus*.
15. (14.) Rostrum coxas medias attingens *Tenosius*.
16. (13.) Capite ante oculos angustatum *Camptopus*.

Ad *Alydi* genus pertinent:

1. *A. calcaratus* LINNÉ; 2. *A. limbatus* H. SCH.; 3. *A. ornaticeps* STÅL; 4. *A. atratus* FABR. sec. Mus. Berol. (e Bahia, Rio Janeiro, Cuba).

BURTINUS STÅL.

Caput inter oculos et antennis vix angustatum. Rostrum coxas medias attingens. Thorax postice supra scutellum latissime vix sinuatus, collari indistincto. Tibiæ posticæ rectæ, femoribus nonnihil breviores, apice haud dentato-productæ, cylindricæ. Tarsi postici articulo 1 apicalibus 2 dimidio longior.

1. *B. notatipennis*. — Pallide griseo-flavescens, parce sericeus; antennis testaceis, articulo ultimo 2 præcedentibus æquilongo, basi pallido; capite basi pone oculos nigro-fasciato; thorace parce punctato, linea media marginibusque angustis lateralibus levibus nec non corii macula longe pone medium pallidis; pectore remote distincte punctato; ventre fusco-adsperso; connexivo fusco-maculato; pedibus, præsertim femoribus posticis, fusco-vel testaceo-adspersis, his incrassatis, subtus spinosis; thorace angulis posticis prominentibus, subobtusis. ♂ ♀. Long. 10—11, lat. 2½ millim. — Mexico, Columbia. Mus. Berol.

HYALYMENUS AM. et SERV.

Huc pertinent:

1. *H. vespiiformis* FABR.; 2. *H. dentatus* FABR.; 3. *H. dubius* DALL.

TIVARBUS STÅL.

Caput ante oculos haud angustatum. Rostrum coxas posticas subattingens. Thorax postice ad latera scutelli dentato-productus, an-

gulis posticis spinosis, collari distincto. Tibiæ posticæ femoribus breviores, arcuatæ, inermes, apice intus dentato-productæ. Articulus 1 tarsorum posticorum 2 apicalibus $\frac{1}{2}$ longior. Abdomen basi subgracile.

Huc pertinent:

1. *A. sinuatus* FABR.; 2. *A. tarsatus* FABR.

TUPALUS STÅL.

Caput inter oculos et antennis haud angustatum. Rostrum coxas posticas haud attingens. Thorax postice ad latera scutelli dentato-productus, angulis posticis acutiusculis; collari nullo. Tibiæ posticæ femoribus breviores, arcuatæ, inermes, apice intus dentato-productæ. Articulus 1 tarsorum posticorum 2 apicalibus fere $\frac{1}{3}$ brevior.

1. *T. arcuatus* FABR.

MIRPERUS STÅL.

Caput inter oculos et antennis parallelum, tuberculis antenniferis extus acute subprominentibus. Rostrum ad coxas medias extensum. Thorax postice ad latera scutelli dentato-productus, angulis posticis acutis, collari nullo. Tibiæ posticæ femoribus breviores, arcuatæ, inermes, apice intus dentato-productæ. Articulus 1 tarsorum posticorum 2 apicalibus vix $\frac{1}{2}$ longiore.

1. *M. jaculus* THUNB.

RIPTORTUS STÅL.

Caput inter oculos et antennis subparallelum. Rostrum trans coxas medias extensum. Thorax postice ante scutellum bisinuatus, angulis posticis spinosis, collari distincto. Tibiæ posticæ arcuatæ, inermes, femoribus breviores, apice dentato-productæ. Tarsi postici articulo 1 apicalibus 2 fere plus $\frac{1}{2}$ longior.

1. *R. dentipes* FABR.; 2. *R. linearis* FABR.

TENOSIUS STÅL.

Caput inter oculos et antennis vix angustatum. Rostrum coxas medias attingens. Thorax postice ante scutellum truncatus, angulis posticis obtusis, collari sat distincto. Tibiæ posticæ arcuatæ, inermes, femoribus breviores, apice dentato-productæ. Tarsi postici articulo 1 apicalibus 2 plus $\frac{1}{2}$ longiore.

1. *T. proletarius* SCHAUM.

CAMPTOPUS AM. et SERV.

1. *C. lateralis* GERM.

HAMEDIUS STÅL.

Caput cum oculis prominulis thorace paullo latius, tuberculis antenniferis lateralibus, lobis inter et ante illa productis. Ocelli ad basin capitis siti, inter se quam ab oculis paullo longius remoti. Antennæ crassæ, subæquicrassæ, articulo 1 capite brevior, apicali 2 præcedentibus ad unum nonnihil longiore. Rostrum vix ad coxas medias extensum, articulo 1 capite brevior, 2 et 4 illi subæquilongis, 3 reliquis brevior. Thorax antice truncatus, collari nullo, posterius utrimque oblique truncato-sinuatus, ante scutellum bisinuatus. Scutellum latitudine paullo longius. Hemelytra abdomine vix angustiora. Pedes breviusculi, femoribus posticis incrassatis, subtus apicem versus spinis nonnullis armatis; tibiis omnibus cylindricis, posticis femoribus fere $\frac{1}{3}$ brevioribus, rectis, apice intus spina armatis; tarsis articulo basali 2 apicalibus vix vel parum longiore.

Hypselopo affine genus.

1. *H. incarnatus* ER. (= *Hypselopus incarnatus* ER.)

PARYPHES BURM.

1. *P. lætus* FABR.; BURM.
2. *P. flavo-cinctus*. — Supra niger, viridi-æneo-punctatus, subtus viridi-æneus; tarsis antennisque nigro-chalybeis, harum basi ipsa, capite, fascia media corii, pectoris disco, segmentis 1 et 2 nec non basi media segmenti 3 ventris tibiisque sordide flavis. ♀. Long. 20, lat. vix 7 millim. — Costa Rica. Mus. Berol.

P. læto valde affinis, pictura ventris alia, thorace latitudine basali hemelytrorum $\frac{1}{4}$ (nec fere $\frac{1}{3}$) brevior, angulis posticis minus acutis et minus prominentibus differt. Articuli 2—4 antennarum exempli descripti desunt.

3. *P. imperialis*. — Niger; capite, rostro, collari, limbis lateralibus thoracis et costali hemelytrorum fere toto, retrorsum angustiore, sterno, marginibus lateralibus et postico prostethii, postico mesostethii, laterali et postico exteriori metastethii, limbo abdominis, fascia apicali segmentorum ventris, coxis, trochanteribus basi que femorum sordide flavescentibus. ♂ ♀. Long. 16—20, lat. 5—6 millim. — Mexico. Mus. Holm.
 4. *P. ducalis*. — Supra niger, subtus cum antennis, pedibus parte que apicali thoracis viridi-æneus; capite, collari, marginibusque lateralibus thoracis, scutello, marginibus costali et apicali corii nec non commisurali clavi testacco-flavis. ♀. Long. 19, lat. 5 millim. — Rio Janeiro. Mus. Berol.
- Anguli postici thoracis nonnihil dilatato-prominentes, obtusiusculi.
5. *P. magnificus*. — Viridi-æneus, capite flavo-testacco; maculis 2 sat magnis thoracis valde distantibus pone medium, hemelytris que

nigris, clavi limbo commisurali, corii limbis costali et apicali nec non scutello sordide flavescens. ♀. Long. 19, lat. 5 millim. — Brasilia, Bahia. Mus. Holm.

Paryphes magnificus STÅL. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1854. p. 234. 1.

Thorax angulis posticis acute prominulis.

6. *P. regalis* HOPE; DALL.

Hue verosimiliter pertinet *Nematopus rufoscutellatus* GRAY. (in GRIFF. An. Kingd. Ins. II. p. 241, Pl. 97. 1).

THERAPTUS STÅL.

Caput vix ad oculos immersum, quadratum, cum oculis thorace antico multo latius, tuberculis antenniferis prominulis, apice oblique truncatis, lobo medio illis æquilongo, inter illa deflexo. Antennæ valde graciles, longæ. Rostrum coxas posticas attingens, articulo 1 caput subsuperante, 2 illo paullo longiore, 3 basali paullo brevior, 4 secundo nonnihil longiore. Thorax collari distincto. Hemelytra abdomini subæquilata. Pedes graciles, posteriores paullo distantes; articulo 1 tarsorum 2 apicalibus paullo longiore.

Paryphi affine genus.

1. *T. carmelita* BURM. — *Chariesterus carmelita* BURM. Handb. der Ent. II. p. 317. 1; *Lagaria* (?) *africana* DALL. List of Hem. II. p. 443. 2. (♀); *Homæocerus apicatus* FAIRM. in THOMSON. Archives Entomol. II. p. 299. 517.

Patria: Sierra Leona, Old Calabar, Gabon, Congo.

SPHICTYRTUS STÅL.

Corpus oblongum vel subelongatum, nonnihil depressum. Caput cum oculis thorace antico nonnihil latius, tuberculis antenniferis haud prominulis, lobis inter illa mox deflexis, leviter productis. Antennæ corpore breviores, modice graciles. Rostrum inter coxas medias productum, articulo basali capiti subæquilongo, 2 illi vix æquilongo, 3 secundo nonnihil brevior. Thorax collari et pone collare callo transverso lævigato instructus. Hemelytra abdomen totum tegentia. Abdomen parallelum. Pedes mediocres, inermes.

1. *S. fasciatus* BURM. — Supra obscure viridi-æneus, subtus cum capite, collari, ruga antica limboque postico thoracis coxisque coccineus; antennis, rostro, pedibus, lobo medio maculaque magna intraoculari capitis, fasciisque apicalibus segmentorum abdominis nigris; pectore utrimque fasciis 3 abbreviatis, limbo laterali (postico excepto) limboque postico (exteriore excepto) prostethii obscure æneis; membrana fusco-olivacea, opaca. ♂. Long. 14, lat. 4 millim. — Brasilia. Mus. Berol.

Chariesterus fasciatus BURM. Handb. der Ent. II. p. 317. 2.
Hypselonotus (?) *fasciatus* DALL. List of Hem. II. p. 465. 5.

Segmentum anale apud ♂ apice bisinuatum.

2. *S. intermedius*. — Supra obscure viridi-æneus, subtus cum capite, collari, ruga antica limboque basali thoracis, scutelli dimidio basali coxisque coccineus; antennis, lobo medio fasciaque posteriore capitis, pedibus, fasciis subapicalibus segmentorum abdominis nigris; pectoris fasciis 3 lateralibus abbreviatis nec non prostethii limbo laterali (postico excepto), limboque postico (exteriore excepto), chalybeo-æneis; membrana fusco-olivacea. ♂ ♀. Long. 13—15, lat. 3½—4 millim. — Cayenna, Columbia. — Mus. Berol.

Variat thorace æneo-chalybeo.

Segmentum anale apud ♂ apice leviter unisinuatum.

3. *S. pervicax*. — Subtus cum capite, parte dimidia basali scutelli, ruga antica thoracis coxisque coccineus; thorace dimidioque apicali scutelli obscure violaceo-chalybeis, hemelytris obscure viridi-æneis; antennis, lobo medio fasciaque posteriore capitis, pedibus abdomineque supra nigris, hoc subtus nigro-fasciato; fasciolis 3 abbreviatis lateralibus pectoris, prostethii marginibus lateralibus et postico latiusculis, marginibus posticis angustis meso- et metastethii violaceo-chalybeis; membrana fusco-olivacea. ♀. Long. 16, lat. 4½ millim.

4. *S. affinis* DALL. — *Hypselonotus* (?) *affinis* DALL. List of Hem. II. p. 466. 6. (♂).

5. *S. sumtuosus* STÅL. — *Paryphes sumtuosus* STÅL. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1854. p. 234. 2. (♂); Fregatten Eugenie's resa. Entomol. p. 232. 32. (♂). — Guayaquil. Mus. Holm.

6. *S. pretiosus*. — Obscure chalybeo-viridis, subtus albidus; antennis, rostro, pedibusque nigris; capite (exceptis macula majore basali fusco-chalybea, lobo medio apicem versus vittulaque loborum lateralium nigris), callo antico, marginibus lateralibus et basali thoracis, costa, maculis pectoris ad coxas, coxis, metastethio posteriorius, limbo ventris anoque rufescente-vel flavescence-testaceis; prostethii fascia anteriore, metastethii fascia arcuata nigris; prostethii et mesostethii limbo postico, hujus etiam fascia angusta chalybeis; fascia apicali extus abbreviata segmentorum ventris nigris. ♂ ♀. Long. 12½—14, lat. 3½—4 millim. — Mexico. Mus. Holm.

Paryphes pretiosus STÅL. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1854. p. 235. 3.

7. *S. cæsareus*. — Viridi-æneus, subtus cum capite dilute sordide flavescens, hujus macula basali majore loboque medio fere toto, antennis, rostro pedibusque nigris; thoracis ruga antica sordide flavescence, limbo basali lutescente; pectore utrinque maculis 3

minoribus nigris. ♀. Long. 17, lat. 6 millim. — Patria ignota. Mus. Holm.

Paryphes cæsareus STÅL. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1854. p. 184. 2. (♀).

TLIPONIUS STÅL.

Corpus plus minus oblongum aut subelongatum. Caput quadratum, tuberculis antenniferis crassiusculis, utroque partem tertiam latitudinis capitis occupante, lobo medio inter illa vix vel parum prominulo, deflexo. Rostrum fere ad coxas intermedias, raro ultra extensum, articulo 1 capite multo brevior, 2 illi subæquilongo, 3 et 4 subæquilongis, secundo nonnihil longioribus. Antennæ plus minus crassæ, articulo 2 primo longiore. Pedes subgraciles, simplices.

Homæocero affine genus.

1. *T. puncticornis* BURM.; = *Homæocerus puncticornis* DALL.
2. *T. abbreviatus* H. SCH.; *Gonocerus* (?) *abbreviatus* H. SCH. Wanz. Ins. VI, p. 81. fig. 652. ♀.
3. *T. limbatipennis*. — Supra flavo-ferrugineus, fusco-punctatus, subtus cum rostro, pedibus limboque laterali thoracis pallide griseo-flavescentis; antennis, vittis 2 capitis, vitta indistiucta intramarginali posterius evanescente thoracis, serie utrimque macularum parvarum pectoris ventrisque, margine basali membranæ dilute infuscate, corii macula discoidali limboque costali latiusculo nigricantibus, hujus margine angustiore costali ultra medium pallide sordide flavescente, antennarum articulo apicali apicem versus pallido. ♀. Long. 15, lat. 4 millim. — Celebes. Mus. Berol.

Thorax longitudine nonnihil latior, angulis posticis acute spinoso-prominentibus. Antennæ valde graciles, articulo apicali præcedente nonnihil brevior.

4. *T. marginellus* H. SCH.; *Gonocerus marginellus* H. SCH. Wanz. Ins. VI. p. 7. fig. 562.
5. *T. plebejus*. — Pallide sordide flavescentis, supra ferrugineo-punctatus; antennis dilute testaceis, thoracis linea media longitudinali lævigata margineque costali corii ante medium pallidis; ventre parce minute fusco-irrorato, hujus spiraculis serieque laterali punctorum 3 pectoris nigris. ♂ ♀. Long. 13—16, lat. 3½—4 millim. — Java. Mus. Berol.

T. marginello longior, major, angulis thoracis minus prominulis. Antennæ corpore fere $\frac{1}{4}$ breviores, articulo apicali basali nonnihil brevior, hoc capite fere duplo longior. Thorax lateribus rectis, angulis posticis levissime prominulis, angulum obtusum formantibus, latitudine basali nonnihil brevior. Heme-lytra abdomine nonnihil angustiora, hujus marginibus paullo dilatatis.

6. *T. cingalensis*. — Pallide sordide flavescens, supra sat dense ferrugineo-punctatus, linea obsoleta media thoracis læviuscula; antennis testaceis, articulo 4 (basi excepta) nigro-fusco; margine hemelytrorum costali ante medium pallido; punctis 3 parvis laterilibus pectoris fuscis; spiraculis infuscatis. ♀. Long. $12\frac{1}{2}$, lat. $3\frac{1}{3}$ millim. — Ceylon. Mus. Berol.

Præcedenti affinis. Antennarum articulus 4 basali $\frac{1}{3}$ brevior, hoc capite nonnihil longiore. Thorax angulis posticis obtusis, vix prominulis, lateribus rectis, latitudini posteriori subæquilongus. Abdomen hemelytris paullo latius.

7. *T. fascifer*. — Pallide olivaceo-flavescens, thorace, hemelytris pectoreque distincte, ventre subtilius punctatis, illius fascia posteriore nigro-fusca; hemelytris fusco-lividis, limbo costali fasciaque corii pone medium dilute sordide virescentibus; membrana sordida, basi fusca; apicibus articularum 1, 2 et 3 antennarum nigris. ♀. Long. 16—18, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Manilla. Mus. Berol.

Antennæ cylindricæ, articulo 1 secundo paullo brevior, cum apicali reliquis paullo crassiore, apicali tertio nonnihil longiore, basali nonnihil brevior. Thorax angulis posticis obtusis, vix prominulis.

8. *T. cordiger*. — Sordide flavescens, minus distincte punctatus; fascia subbasali thoracis nigro-fusca; hemelytris sordide dilute testaceis, limbo costali ad medium maculaque corii magna subcordata pone clavum sordide flavescens; membrana sordida, basi fusca; maculis marginalibus superis abdominis fuscis vel rufis; antennarum articulis 1 et 4 testaceis, hoc infuscato, 2 et 3 apice nigris, hoc ibidem compresso. ♂. Long. 14, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Tranquebar. Mus. Berol.

Antennæ cylindricæ, articulo 4 præcedente fere $\frac{1}{3}$ brevior, hoc apicem versus compresso, basali nonnihil longiore, secundo nonnihil brevior. Thorax angulis posticis acutis, prominulis.

9. *T. rugifer*. — Dilute griseo-flavescens, supra distincte punctatus, pectore subrugoso-punctato; antennis fuscis, æquicrassis; vittis 2 capitis, limbis postico-lateralibus, maculis 2 posticis thoracis (interdum rufescentibus) maculaque parva corii discoidali nigris, hoc intus clavoque dilute sanguineis, nigro-punctatis; ruga pectoris longitudinali ante coxas medias lævi, pallidiore; ventris disco utrimque plica longitudinali instructo. ♀. Long. 13, lat. 4 millim. — Caffraria. Mus. Berol.

Antennæ cylindricæ, articulo 1 capite vix longiore, secundo illo plus $\frac{1}{2}$ longiore, 3 apicem versus levissime compresso-incrasato, basali paullo longiore, 4 basali subbrevior. Thorax angulis lateralibus subdilato-prominentibus, rectis, marginibus lateralibus posterius sinuatis.

10. *T. insignicornis*. — Dilute sordide flavescens, minute granulatus; capitis thoracisque marginibus lateralibus, hujus etiam ba-

sali, femoribusque apicem versus sordide sanguineis; tibiis tarsisque obscure fusco-sanguineis, antennis nigro-fuscis, articulo 3 basi flavo-testaceo, 2 basi et basali toto obscure sanguineis; hemelytris sordide griseis, corio intus ad membranam macula pallida; margine segmentorum abdominis dorsali fusco-bimaculato. ♀. Long. 14, lat. $3\frac{2}{3}$ millim. — Patria ignota. Mus. Berol.

Antennæ articulo 1 capite vix duplo longiore, æquierasso, triquetro, 2 et 3 longioribus, 2 versus medium, 3 versus apicem magis compressis, hoc illo paullo brevior, (art. apicalis deest.) Thorax marginibus lateralibus rectis, angulis posticis rectis, sursum prominulis.

LATIMBUS STÅL.

Corpus elongatum, subcompressum. Caput quadratum, fere ad oculos prominentes immersum, tuberculis antenniferis apice truncatis, antice ante lobum medium coeuntibus. Ocelli inter se quam ab oculis paullo longius remoti. Antennæ longæ, graciles. Rostrum ultra medium mesosterni extensum, articulis 1, 2 et 4 subæquilongis, 1 capite brevior, 3 illo paullo brevior. Scutellum latitudine paullo longius. Hemelytra retrorsum nonnihil angustata. Abdomen hemelytris æquilatum (♂), vel paullo latius (♀). Pedes mediocres, femoribus subtus spinulosus.

Homæocero affine genus.

1. *L. armipes*. — Sordide flavescens-subferrugineus, punctatus, marginibus lateralibus angustis thoracis antennisque nigris, harum articuli ultimi dimidio basali (basi ipsa excepta) flavo-albido; membrana fusca. ♂ ♀. Long. 12—15, lat. $3\frac{1}{2}$ —4 millim. — Old Calabar. Coll. DOHRN. et STÅL.

Antennæ corpore paullo longiores, graciles, articulis 2 et 4 æquilongis, 3 illis paullo brevior, 1 secundo et dimidio tertii ad unum æquilongo. Thorax marginibus lateralibus rectis, angulis posticis rectis, apice acutis, prominulis. Femora omnia maris subtus seriebus 2 spinularum, basin versus minorum; antica feminae subtus seriebus 2 spinularum rariorum minutissimarum armata, posteriora inermia.

PENDULINUS THUNB.

Pendulinus THUNB. Diss. de Hem. rostrat. Capens. IV. p. 5. (1822); Ins. Hemel. tria genera illustr. p. 3. (1825).

Galæsus DALL. List of Hem. II. p. 440. (1852).

Antennæ hujus generis nunc simplices, nunc articulo tertio apicem versus foliaceo-dilatato.

Huc pertinent:

1. *P. hasticornis* THUNB.; *Cimex hasticornis* THUNB. Nov. spec. Ins. III. p. 53. fig. 64. (1784); *Pendulinus hasticornis* THUNB. Diss. de Hem. rostrat. Capens. IV. p. 5. (1822); Ins. Hemel. tria ge-

nera illustr. p. 3. 2. (1825); *Coreus bicolor* G. R. GRAY in GRIFF. An. Kingd. XV. pl. 92. fig. 4. (1832); *Galæsus hasticornis* DALL. List of Hem. II. p. 441. 1. Pl. XIII. fig. 2. (1852).

Patria: Caput bonæ spei.

2. *P. rufifemoratus* DALL; *Galæsus rufifemoratus* DALL. List of Hem. II. p. 441. 2. (♀).

Patria: Gambia.

3. *P. melanocnemis* STÅL; *Homoeocerus melanocnemis* STÅL. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1858. p. 439. 1. (♂ ♀).

Patria: Mozambique.

4. *P. coccocinctus* BURM.; *Coreus coccocinctus* BURM. in Nov. Act. Acad. Leop. XVI. Supp. 297. 24. (1834); *Paryphes* (?) *coccocinctus* DALL. List of Hem. II. p. 440. 4.

Patria: Manilla.

CNEMOMIS STÅL.

Corpus elongatum, retrorsum angustatum. Caput quadratum, cum oculis thorace paullo latius, tuberculis antenniferis haud prominulis, lobis mox ante illa subito valde deflexis. Ocelli inter se et ab oculis fere æquilongè distantes. Antennæ valde graciles, longæ. Rostrum fere ultra medium metasterni extensum, articulo 1 caput subsuperante, reliquis crassiore, 2 illi æquilongo, 3 illis brevior. Thorax postice quam antice duplo latior, antice truncatus, collari minus distincto. Hemelytra abdomine paullo angustiora.

1. *C. gracilis* DALL; *Paryphes gracilis* DALL. List of Hem. II. p. 439. 3. (♂).

PISTOCUS STÅL.

Corpus subdepressum. Caput fere ad oculos valde prominentes immersum, transversim quadratum, mox ante oculos levissime emarginatum, tuberculis antenniferis haud prominulis, lobo medio obtuso, prominulo, spatium inter illa occupante. Ocelli inter se quam ad oculos paullo magis approximati. Antennæ valde graciles. Rostrum vix ultra medium metasterni extensum, articulo 1 caput vix superante, 2 illo subbreviore, 3 secundo æquilongo et apicali brevior. Thorax antice truncatus, capite paullo angustior, collari distincto, antice ruga transversa instructus. Hemelytra abdomine subæquilata. Tarsi articulo 1 apicalibus 2 nonnihil longior.

Cnemomi affine genus.

1. *P. oralis*. — Supra dilute testaceus, cum pectore distincte punctatus, subtus cum pedibus sordide flavescens; antennis, marginibus lateralibus thoracis et costali hemelytrorum fusco-olivaceis; membrana hyalina. ♂. Long. 13, lat. $3\frac{3}{4}$ millim. — Pará. Mus. Berol.

Antennæ articulo 1 thoraci subæquilongo, 2 basali, 3 secundo nonnihil brevioribus. Thorax angulis posticis obtusis, vix prominulis.

Huic generi verosimiliter adnumerandus *Paryphes* (?) *dubius* DALL. List of Hem. II. p. 440. 6. (♀).

STENOCEPHALUS LATR.

1. *S. lautipes*. — Supra griseus, fusco-punctatus, subtus fusco-subferrugineus, pectore nitido, sat fortiter denseque punctato; antennis, pedibus, scutelli apice imo, punctis venæ intracostalis corii maculisque parvis marginalibus abdominis pallidis; capite, antennarum articulo basali (articuli 2 apicales desunt), apicibusque femorum posteriorum nigris. ♀. Long. 13, lat. 3 millim. — Senegal. Mus. Berol.

S. Caffro affinis videtur; *S. uugaci* etiam similis, angustior, colore pedum antennarumque alio; antennarum articulo 2 basali plus $\frac{1}{2}$ longiore; angulis posticis thoracis obtusis, haud prominulis.

2. *S. testaceus*. — Dilute ferrugineus, supra obscurius punctatus; pectore minus dense sat fortiter nigro-punctato; femoribus posticis apice tarsorumque articulo apicali fuscis; antennarum articulis 2 apicalibus apicem versus obscurioribus, abdomine subtus fusco-vario, margine supero nigro-maculato. ♀. Long. 12, lat. $3\frac{1}{4}$ millim. — Caput bonæ spei.

Statura *S. uugacis*, aliter coloratus; articulo 2 antennarum basali fere $\frac{1}{2}$ longiore, apicali secundo vix longiore; angulis posticis thoracis acutis, subprominulis.

PSOTILNUS STÅL.

Corpus elongatum. Caput cylindricum, thorace longius, lobis lateralibus productis medio longioribus, contiguis, apice divaricatis, acutis. Ocelli medii inter capituli basin et apicem tuberculorum antenniferorum. Ocelli inter se, a basi capituli et ab oculis fere æquilongæ distantes. Rostrum ad coxas medias extensum, articulis basali et secundo æquilongis, illo oculorum marginem posticum æquante, 3 illis brevioribus. Thorax basi truncatus, angulis basalibus mucrone horizontali armatis. Scutellum latitudine longius. Hemelytra abdomine angustiora, abbreviata, membrana incompleta (an semper?). Pedes mediocres, femoribus crassiusculis, inermibus; tarsorum articulo 1 apicalibus 2 ad unum paullo longiore.

Stenocephalo proximum genus.

1. *P. mucronifer*. — Dilute ferrugineus, pectore, scutello, hemelytris, thoraceque pone medium sat fortiter punctatis, hujus mucronibus fuscis; ventre obsolete fusco-maculato. ♀. Long. 14, lat. $2\frac{1}{2}$ millim. — Caput bonæ spei. Mus. Berol.

STIROPTUS STÅL.

Corpus valde elongatum, compressum, parallelum. Caput ad oculos immersum, tuberculis antenniferis haud prominulis, lobis ante illa triangulariter productis, medio lateralibus paullo longiore. Ocelli inter se quam ab oculis magis distantes. Rostrum coxas medias vix superans, articulis 1, 2 et 4 subæquilongis, 3 brevior. Thorax collari instructus, postice ante scutellum leviter sinuatus, utrimque oblique truncatus. Scutellum latitudine longius. Hemelytra abdomini æquilata; membrana longitrorsum nervosa. Anguli postico-laterales metastethii recti. Pedes breviusculi, posteriores paullo distantes; femoribus subtus prope apicem spinula armatis; tibiis cylindricis, extus sulcatis, posticis femoribus paullo longioribus; tarsis articulo 1 apicalibus 2 paullo longiore.

Chorosomati affine genus.

1. *S. lineaticornis*. — Pallide griseo-flavescens, supra (excepto capite) fusco-punctatus; antennarum articulis 2 et 3 testaceis, horum apice, linea exteriori articuli 1, marginibus ipsis lateralibus thoracis, punctis 2 lateralibus pectoris, serieque utrimque punctorum ventris nigris; linea media thoracis supra scutellum continuata, hujus etiam marginibus lateralibus lævibus; membrana infuscata, æneo-micante. ♀. Long. 19, lat. $3\frac{1}{2}$ millim. — Rio Janeiro. Mus. Berol.

Articulus 1 antennarum capite nonnihil longior, 2 illo vix, 3 eodem distincte brevior (art. apicalis deest.). Thorax antrorsum leviter angustatus, angulis posterioribus haud prominulis, denticulo minuto armatis, marginibus lateralibus minute crenulatis.

DARMISTUS STÅL.

Corpus subelongatum. Caput lobis inter et ante tubercula antennifera antrorsum productis, lateralibus medio longioribus, contiguis; pone oculos callo nullo. Ocelli inter se quam ad oculos magis approximati. Antennæ corpore fere $\frac{1}{4}$ breviores, articulis 1 et 4 leviter incrassatis, illo capite brevior, omnium brevissimo, 4 basali duplo longiore. Rostrum coxas intermedias haud superans, articulo 1 capitis basin subattingente, 2 illo longiore, 3 brevissimo cum 4 primo brevior. Thorax postice longitudini æquilatus, collari instructus. Scutellum latitudine longius. Hemelytra abdomini æquilata; membrana parcius venosa. Anguli postico-laterales metastethii producti, dilatati, segmentum ventris basale utrimque tegentes.

Leptocorisæ affine genus.

1. *D. subvittatus*. — Pallide griseo-flavescens, supra cum pectore distincte punctatus, vittis 2 capitis, 4 obsoletis thoracis hemelytrisque fusco-punctatis: vitta infera capitis, media pectoris ventrisque nigris. ♂. Long. 9, lat. vix 2 millim. — Mexico. Mus. Berol.

PLINACHTUS STÅL.

Corpus oblongum. Caput vix ad oculos immersum, lobis ante antennis nonnihil productis, medio lateralibus vix longiore, parte pone antennis quadrata. Antennæ corpore breviores, subgraciles. Rostrum coxas intermedias subsuperans, articulo 1 capite nonnihil brevior. Thorax latitudine brevior, angulis posticis spina subsursum et subantrorsum vergente armatis. Elytra abdomen tegentia; venis membranæ raro furcatis. Metasternum leviter sulcatum. Pedes mediocres, simplices, postici quam medii paullo magis distantes.

Gonocero affine genus.

1. *P. pungens* THUNB.; *Cimex pungens* THUNB. Nov. spec. Ins. II. p. 36. (1783); *Alydus pungens* THUNB. Diss. de Hem. rostrat. Capens. III. p. 2. (1822); *Gonocerus pungens* STÅL. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 195. 3. (♀). — Caput bonæ spei. Mus. Holm.
2. *P. pugionatus*. — Dilute sordide flavescens, supra dense dilute sordide sanguinco-adspersus et indutus; antenarum articulis 2 et 3 apicem versus æqualiter compresso-incrassatis, parte incrassata nigra; capite utrimque pone antennis linea percurrente nigro-fusca; marginibus lateralibus thoracis levissime sinuatis; dimidio basali marginis corii costalis pallido; membrana fusco-hyalina; maculis majoribus marginalibus supernis, stigmatibus segmentorum 2, 3 et 4 nec non maculis 2 valde minutis pectoris nigris. ♀. Long. $14\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Caffraria. Mus. Berol.

Præcedenti valde affinis. (Articulus apicalis antenarum deest).

3. *P. spinosus*. — Sordide flavo-albidus, supra sat dense fusco-punctatus, cum antenarum articulis 1 et 2 dilute rufescente-indutus; antenarum articulis 2 et 3 simplicibus, apice nigris, ultimo medio dilute fusciscente; capite utrimque pone antennis linea nigro-fusca; membrana sordida; maculis 2 minutis utrimque pectoris spiraculisque segmentorum ventralium 2, 3 et 4 nigris; tibiis apicem versus tarsisque dilute rufescentibus. ♂. Long. 11, lat. 3 millim. — Caput bonæ spei. Mus. Berol.

Præcedentibus valde similis.

4. *P. acicularis* FABR.; *Alydus acicularis* FABR. Syst. Rhyng. p. 251. 14. (1803). — Ceylon. Coll. DOHRN.
5. *P. ventralis* DALL; *Leptoscelis ventralis* DALL. List. of Hem. II. p. 458. 10. (♀). (1852). — Ceylon. Mus. Berol.

CATORHINTHA STÅL.

Corpus valde oblongum, parallelum. Caput cum oculis thorace nonnihil latius, vix ad oculos immersum, parte pone antennis transversa, tuberculis antenniferis haud prominulis, extus sæpe spinosis, lobis inter illa distinctis, nonnihil productis et reflexis. Antennæ corpore multo breviores, articulis 1 et 4 reliquis paullo crassioribus, 1

capiti vix æquilongo, 2 et 3 æquilongis, basali sublongioribus. Rostrum ad coxas medias extensum, raro paullo brevius, articulo 1 capiti æquilongo vel paullo brevior, 2 illi subæquilongo, et tertio longiore. Thorax antrorsum nonnihil angustatus, angulis posticis haud prominulis, antice truncatus. Hemelytra abdomini vix æquilata, venis membranæ longitudinalibus, rarius anastomosantibus. Pedes breviusculi, simplices, posteriores nonnihil (postici paullo magis quam medii) distantes.

Gonocero affine genus.

A. Tuberculis antenniferis extus spinula antrorsum producta armatis.

a. Rostro coxas medias haud attingente.

1. *C. perfida*. — Depressiuscula, pallide sordide flavescens, supra cum antennis griseo- vel dilute testaceo-induta, fusco- vel subferrugineo-punctata; abdomine supra nigro, limbo rufescente, maculis 2 mediis albidis; serie utrimque pectoris ventrisque macularum minutarum nigrarum. ♂ ♀. Long. 10, lat. 3 millim. — Brasilia. Mus. Berol.

b. Rostro coxas medias attingente.

2. *C. guttula* FABR.; *Lygæus guttula* FABR. Ent. syst. IV. p. 162. 92; Syst. Rhyng. p. 228. 119. — Insulæ Indiæ occidentalis, Columbia.

B. Capite haud spinoso.

3. *C. Selector*. — Flavo-albida, supra fusco-punctata; antennis, ocellis, basi ipsa capitis, abdomine supra (excepto limbo immaculato), serie utrimque macularum pectoris ventrisque nigris, hoc pedibusque nigro-irroratis; marginibus lateralibus thoracis, scutelli apice imo, puncta pone medium corii apiceque articuli apicalis antenarum pallidis. ♂ ♀. Long. 11, lat. 3 millim. — Mexico. Mus. Berol.

C. guttula major, dilutior, capite inermi.

SCAMURIUS STÅL.

Corpus oblongum, parallelum, subcompressum. Caput quadratum, tuberculis antenniferis haud prominulis, lobo medio illis paullo longiore, obtuso, apice utrimque dente parvo armato. Antennæ corpore breviores, articulo 1 secundo æquilongo. Rostrum coxas medias plus minus superans, articulis 1—3 subæquilongis, ultimo paullo longiore. Abdomen hemelytris paullo latius. Pedes mediocres, posteriores nonnihil distantes; tarsis posticis articulo 1 apicalibus 2 paullo longiore.

Discogastro affine genus.

1. *S. anabilis*. — Pallide subolivaceo-flavescens, thorace minute granulato, angulis posticis rectis, distincte prominentibus; hemelytris pectoreque punctatis, punctis distinctioribus clavi sanguineis vel sanguineo-fuscis, limbo angusto apicali corii sanguineo; pectore

ventreque pallide flavescente-vittatis. ♀. Long. 17, lat. 6 millim.
— Minas Geraës. Mus. Holm.

Paryphes amabilis STÅL. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1855. p
184. 3. ♀.

Antennæ articulis 1 et 2 æquilongis, 3 illis nonnihil brevioribus, 4 tertio $\frac{1}{2}$ longiore.

2. *S. consors*. — Pallide subolivaceo-flavescens; thorace minute granulato, angulis posticis subobtusis, parum prominentibus, hemelytris pectoreque punctatis, punctis clavi limboque angusto apicali corii sanguineis; pectore ventreque flavo-vittatis. ♂. Long. 14, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia. Mus. Berol.

Præcedenti similis. Antennæ articulis 1 et 3, ut 2 et 4 subæquilongis, his illis paullo longioribus. Pectus utrimque prope coxas vitta flavescente, supra ventrem continuata ornatum.

3. *S. lateralis*. — Pallide subolivaceo-flavescens; thorace minute granulato, angulis posticis rectis, subacutis, nonnihil prominentibus; hemelytris pectoreque punctatis, punctis clavi fuscis; pectore ventreque flavo-vittatis; spiraculis ventris anguste nigro-cinctis; prostethii vitta angusta utrimque laterali intramarginali, posterius abbreviata, nigra. ♀. Long. 18, lat. 5 millim. — Brasilia. Mus. Berol.

S. amabili similis, angulis thoracis magis prominulis. Antennæ articulis 1 et 2 subæquilongis, 3 illis paullo brevioribus. (Art. ultimus deest).

LUPANTHUS STÅL.

Scamurio valde affine genus, differt: corpore depresso, rostri articulis (excepto tertio brevioribus) subæquilongis.

1. *L. incarnatus*. — Testaceo-flavescens, thorace granulato; scutello clavoque distincte, corio subtilius punctatis, hoc dilute sordide sanguineo, limbo latiusculo costali ultra medium pallido, fortius nigro-punctato; membrana dilute fusco-hyalina, basi fusca. ♂ ♀. Long. 13—15, lat. 4—5 millim. — Brasilia. Mus. Berol.

Antennæ articulis 2 et 3 basali et apicali distincte gracilioribus, 1 et 2 æquilongis, 4 præcedentibus 2 ad unum distincte brevioribus, tertio cum $\frac{2}{3}$ secundi ad unum æquilongis. Thorax angulis posticis prominulis, marginibus lateralibus rectis.

2. *L. cliens*. — Testaceo-flavescens, antennis dilute testaceis; thorace granulato, utrimque pallido-marginato; scutello hemelytrisque (his apicem versus obsoletius) punctatis, corii limbo lato costali pallido, nigro-punctato; membrana dilute fusco-hyalina, basi fusca. ♀. Long. 14, lat. $4\frac{1}{2}$ millim. — Brasilia. Mus. Berol.

Præcedenti valde affinis, antenarum articulis 2 et 3 basali et apicali minus distincte gracilioribus, 4 præcedentibus 2 ad unum vix æquilongis.

Genus "*Chariesterus*" LAP. in tria, sequentibus notis distinguenda, divido:

1. (4.) Mesosterno vix vel levissime sulcato; antennarum articulo 1 apice subclavato vel apicem versus incrassato; tibiis posticis femoribus sublongioribus; articulo 1 tarsorum posticorum apicalibus 2 nonnihil longiore.
2. (3.) Thoracis angulis posticis spinula armatis; articulo 1 antennarum secundo longiore, clavato *Plapigus*.
3. (2.) Thoracis angulis posticis muticis, articulo 1 antennarum secundo subæquilongo, apicem versus sensim crassiore *Staluptus*.
4. (1.) Mesosterno et basi metasterni (hac profundius) sulcatis; antennarum articulo 1 crasso, toto subæquicrasso; tibiis posticis femoribus brevioribus; articulo 1 tarsorum posticorum 2 apicalibus subæquilongo. . *Chariesterus*.

STALUPTUS STÅL.

1. *S. marginalis* BURM. — *Chariesterus marginalis* BURM. Handb. der Ent. II. p. 317. 3. — Mexico.

PLAPIGUS STÅL.

1. *P. veillarius* BURM. — *Chariesterus veillarius* BURM. Handb. der Ent. II. p. 317. 6. — Brasilia.
2. *P. circumductus*. — Niger, supra parce flavo-sericeus; capite subtus, margineque angusto costali hemelytrorum testaceo-flavis; subtus cum marginibus antico et lateralibus thoracis ante spinas dense testaceo-flavo-sericeus, fasciis incisurarum pectoris, prostethii vitta utrimque marginali, vittis 2 mesosterni, fascia media basali fasciolaque abbreviata obliqua laterali segmentorum ventris nigris, denudatis. ♀. Long. 16, lat. 4½ millim. — Columbia. Mus. Berol.

Caput tuberculis antenniferis parum prominulis, inermibus, angulo apicali interno obtuso. Antennæ articulo 1 apice leviter incrassato, thorace nonnihil longiore, inermi, articulo 3 toto dilatato, obovato, ultimo æquilongo, latitudine vix duplo longiore. Thorax marginibus integris, angulis posticis spinula horizontali armatis. Femora inermia.

3. *P. circumcinctus*. — Niger, capite, marginibus antico et lateralibus spinisque thoracis, limbo costali corii limboque ventris flavescens-testaceis; subtus cum collari marginibusque angustis lateralibus thoracis dense griseo-sericeus; fasciis pectoris, fascia media basali fasciolaque laterali obliqua segmentorum ventris nigris; femoribus ultra medium testaceis, annulo pone medium tiliarum an-

teriorum testaceo-albido. ♀. Long. 11, lat. 3 millim. — Mexico. Mus. Berol.

Præcedenti similis et affinis, angulo interno tuberculorum antenniferorum acuto, longius producto. Articulus apicalis antennarum tertio paullo longior, hoc obovato, basi ipsa albido, latitudine duplo longiore. Thorax marginibus integris, angulis posticis spina subsursum leviter producta armatis. Femora prope apicem subtus spinulis 2 armatis.

4. *P. patellatus*. -- Niger, subtus dense albido-farinosus, nigro-fasciatus; basi ipsa articuli 3 antennarum valde dilatati albida; marginibus antico et lateralibus thoracis nec non costali hemelytrorum sordide testaceis; maculis 2 dorsalibus abdominis annuloque pone medium tibiaram anteriorum flavo-albidis. ♂ ♀. Long. 10½, lat. 3 millim. — La Guayra. Mus. Berol.

Tubercula antennifera intus acute spinoso-producta. Thorax angulis spina extrorsum et subsursum producta armatis. Antennæ articulo 3 valde dilatato, obovato, latitudinè nonnihil breviorè. Femora subtus prope apicem bispinulosa.

CHARIESTERUS LAP.

1. *C. albiventris* BURM. Handb. der Ent. II. p. 317. 4. — Mexico. Obs. Femora subtus prope apicem bispinosa. (sec. ex typica).
2. *C. moestus* BURM. Handb. der Ent. II. p. 317. 5. — Mexico. Obs. Femora subtus prope apicem trispinosa. (sec. ex typica).
3. *C. gracilis* LAP. Essai d'une Classif. des Hém. p. 44. Pl. 53. fig. 6. — Cayenna. Species mihi haud rite nota.

VILGA STÅL.

Corpus oblongum, compressum. Caput haud ad oculos immersum, tuberculis antenniferis haud prominulis, extus spinosis, lobis inter illa nonnihil productis et deflexis. Antennæ articulo basali spinuloso. Rostrum usque ad coxas posticas extensum, articulo 1 caput haud superante, 2 illi subaequilongo, 3 illis breviorè. Thorax collari instructus, spinosus, postice ante scutellum sinuatus, angulis posticis dilatato-productis, lateralibus spinoso-prominentibus. Scutellum convexiusculum. Meso- et metasterna profunde canaliculata. Abdomen utrumque rotundato-ampliatum, hemelytris latius, margine spinosum. Pedes mediocres, femoribus spinulosis, posticis apicem versus incrassatis, spinis inferis majoribus; tibiis posticis femoribus æquilongis; tarsis articulo 1 apicalibus 2 ad unum paullo longiorè.

1. *V. Acanthion* DALL. — *Clavigralla Acanthion* DALL. List of Hem. II. p. 512. 3. (♀). — Brasilia.

CERCINTHUS STÅL.

Corpus oblongo-ovatum. Caput cylindricum, thoraci subæquilongum, thoraci antico æquilatum, apice utrimque pone antennis spinula crassa, laterali, armatum, latitudine fere $\frac{1}{2}$ longius. Oculi parvi, pone medium capitis siti, a basi sat longe remoti. Rostrum ultra basin ventris productum, articulo 1 capite brevior. Antennæ corpore nonnihil breviores, crassiusculæ, articulo 1 crasso, triquetro, capite paullo brevior, 2 et 3 gracilioribus, subtriquetris, hoc apice oblique terminato, apicali fusiformi, brevi. Thorax utrimque sinuatus, postice ante scutellum late sinuatus, marginibus spinulosus. Scutellum latitudine longius. Membrana reticulato-venosa. Pectus medio sulco profundo, a basi ventris in segmentum tertium extenso instructum. Abdomen utrimque ampliatur.

Coreo affine genus.

1. *C. Lehmanni* KOLEN; *Centrocoris Lehmanni* KOLEN. Melet. Entom. VI. p. 78. — Deserta Kirghisorum. sec. *Kolenati*; Aegyptus. Dom. CHR. LOVÉN. Mus. Holm.

VERLUSIA SPIN.

1. *V. pustulifera*. — Testaceo-flavescens, capite antennisque rufescentibus; thoracis marginibus lateralibus maculaque minore corii ad membranam haud longe ad apice clavi pallidis; ventre latera versus serie punctorum nigrorum. ♀. Long. $12\frac{1}{2}$, lat. 4 millim. — Sir Daria. Mus. Berol.

V. sulcicorni proxima. Antennæ articulo 1 triquetro, secundo nonnihil brevior, 2 et 3 compressis, subæquilatis, 3 basali sublongiore, apicem versus sensim levissime latiore, apice oblique truncato, 4 fusiformi. Thorax marginibus lateralibus subrectis, angulis posticis rectis, obtusis, nonnihil prominulis. Abdomen utrimque leviter rotundato-ampliatum.

Akademiska angelägenheter.

På hemställan af Herrar LILLIEHÖÖK, EDLUND och LINDHAGEN beslöt Akademien, att öfver vattenhöjdens i Östersjön periodiska förändringar iakttagelser skulle anställas vid Stockholm under nämnda Herrars inseende, samt bref afgå till Örlogsmanna-Sällskapet i Carlskrona om dylika observationers anställande derstädes.

Hr Assessor E. BURMAN hade insändt meteorologiska observationer vid Öfver-Torneå, Nov. 1858—Oct. 1859. Öfverlemnades till det Astronomiska Observatorium.

Af de under inseende af Hr FRIES utförda taflor öfver Svenska Svamparter inlemnades 50 st. nya, innehållande afbildningar af 60 arter.

Skänker till Rikets Naturhistoriska Museum.

Zoologiska afdelningen.

Af Lector C. Hartman.

En Capra hireus från Java.

Af Justitie-Rådet Thyselius.

Ett elghufvud.

Af Professor W. Peters i Berlin.

Två exemplar af Emys europæa.

Af Professor Scholander.

Ett stort getingbo.

Af Hofjägmästaren Grefve C. M. Lewenhaupt.

Ett getingbo af Vespa Crabro.

Botaniska afdelningen.

Af Lector Lindeberg i Götheborg.

En samling af 106 växtarter, de flesta mycket sällsynta, från Bohuslän, Norge, Skåne o. s. v.

Af Mag. Kindberg i Wenersborg.

En samling af 77 mindre allmänna växtarter, mest från Dahlsland.

